



Дата \_\_\_\_\_

медична картка №

Пацієнт(ка) \_\_\_\_\_

### Огляд анестезіолога

Загальний стан \_\_\_\_\_ Т \_\_\_\_\_  
Шкіра \_\_\_\_\_  
Підшкірно-жирова клітковина розвинута добре, задовільно, кахексія, гіпотрофія \_\_\_\_\_ ст. Маса= \_\_\_\_\_  
Опорно рухова система \_\_\_\_\_  
Носове дихання вільне, утруднене \_\_\_\_\_  
Аускультативно над легенями вислуховується дихання: везикулярне, ослаблене, жорстке, хрипи \_\_\_\_\_  
Тони серця: звучні, зниженої звучності, значно зниженої звучності, чисті, ритмічні, аритмія \_\_\_\_\_  
Вислуховується шум \_\_\_\_\_ + \_\_\_\_\_ Ч.С.С. \_\_\_\_\_ А.Т. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Язик чистий, обкладений, вологий, сухий. Зів: мигдалики гіперемовані, незміні, гіпертрофія \_\_\_\_\_ ст.  
Живіт м'який, піддутий; доступний, болючий при пальпації \_\_\_\_\_  
Фізіологічні відправлення \_\_\_\_\_  
Алергічний анамнез: необтяжений, обтяжений \_\_\_\_\_  
Спадковий анамнез: необтяжений, обтяжений \_\_\_\_\_  
Ступінь ризику анестезіологічного втручання ASA: \_\_\_\_\_  
Плаується оперативне втручання під \_\_\_\_\_  
Премедикація В/М В/В за \_\_\_\_\_ хв до оперативного втручання:  
Р-н Атропіну 0,1% \_\_\_\_\_ мл.  
Дімедролу 1% \_\_\_\_\_ мл.  
Омнополу 2% \_\_\_\_\_ мл.  
Сибазону 0,5% \_\_\_\_\_ мл.  
Інше \_\_\_\_\_ мл.

Підпис анестезіолога \_\_\_\_\_

### Протокол наркозу

Доставлений в операційну. Премедикація (не) адекватна \_\_\_\_\_  
Катетеризація \_\_\_\_\_ вени.  
Ввідний наркоз д/в \_\_\_\_\_  
масковий (фторотан, наркотан) \_\_\_\_\_  
Досягнуто стадію наркозу \_\_\_\_\_  
Зіниці \_\_\_\_\_, ведичина \_\_\_\_\_  
Д/в введено міорелаксантин \_\_\_\_\_  
Гіпервентиляція. Інтубація тра з \_\_\_\_\_ спроби \_\_\_\_\_  
Утруднена \_\_\_\_\_  
Ш.В.Л. апаратом/ручним способом. Ч.Д.= \_\_\_\_\_, Хв.О.= \_\_\_\_\_  
Аскультативно над легенями \_\_\_\_\_ дихання, (не симетричне) з обох сторін.  
Нозо-, ото-гастральний зонд \_\_\_\_\_ Томпонада ротової порожнини \_\_\_\_\_  
Катетеризація сечового міхура \_\_\_\_\_  
Основний наркоз: д/в \_\_\_\_\_  
Масковий (фторотан, наркотан) \_\_\_\_\_, Е/Т; Е/Т+НЛА-ІІ  
(дроперідол+фенамін) \_\_\_\_\_  
Під час наркозу гемодинаміка (не) стабільна \_\_\_\_\_  
Введено д/в \_\_\_\_\_  
Відновилось самостійне дихання (не) адекватне, (не) симетричне з обох сторін \_\_\_\_\_  
Екстубований (на). Дихання (не) адекватне, самостійне \_\_\_\_\_  
Тривалість наркозу \_\_\_\_\_  
Вихід з наркозу \_\_\_\_\_  
Для подальшого лікування переводиться в \_\_\_\_\_ відділення, під  
спостереження медичного персоналу.

Дата \_\_\_\_\_

Анестезіолог \_\_\_\_\_